

Decubitus Risico Scorelijst				
Aantal punten	0	1	2	3
Mentale toestand	Goed	Lusteloos, gedeprimeerd, gedesoriënteerd, angstig	Zwaar depressief, psychotisch verward, volledig apathisch	Stuporeus comateus
Neurologie	Geen afwijkingen	Geringe stoornissen, krachtsvermindering	Sensibiliteitsstoornissen, lichte hemiparese (2x de score)	Hemiparese (2x de score), dwarslaesie (onder th 6 3x de score en boven th 6 4x de score)
Mobiliteit	Goed	Licht beperkt, loopt met hulp, rolstoel patiënt met goede armfunctie	Voorname­lijk bedlegerig, alleen uit bed met wassen en bed verschonen, hele dag passief in de stoel	Geheel bedlegerig
Voeding	Volgens de aanbevolen hoeveelheden, volledig sv, TPV	Meer dan 1 week minder gegeten dan aanbevolen hoeveelheden, gedeeltelijk sv of parenterale voeding en geen overige voeding	Meer dan 5 dagen geen voeding, gedeeltelijke bijvoeding en geen overige voeding	Meer dan 5 dagen geen voeding en geen suppletie, langer dan 5 dagen geen glucose/NaCl infuus
Incontinentie	Geen	Af en toe urine	Urine en/of feces (bij katheter of uritip)	Geheel incontinent
Leeftijd	< 50 jaar	> 50 jaar	> 60 jaar	> 70 jaar
Temperatuur	< 37.5	> 37.5	> 38.5	> 39.0 of < 35
Medicatie	Geen	Corticosteroiden, anti-coagulantia. Dit geldt niet voor calparine	Slaapmiddelen, pijnstillers, tranquilizers, orale antibiotica	Parenterale antibiotica
Diabetes	Geen	Alleen dieet	Dieet/tabletten	Dieet/insuline